## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

60-168351

(43) Date of publication of application: 31.08.1985

(51)Int.Cl.

A23K 1/175

A23K 1/18

(21)Application number: 59-010328

(71)Applicant: MITSUI TOATSU CHEM INC

(22)Date of filing:

25.01.1984

(72)Inventor: ANDO SHINJI

**OTAGURO MASAZO** MASUDA TAKAYOSHI WATANABE KEISUKE

## (54) FEED ADDITIVE COMPOSITION

### (57)Abstract:

PURPOSE: A feed additive, obtained by granulating a mixture containing calcium carbonate and a specific material, and capable of passing through the rumen of ruminants and dissolving out satisfactorily in the abomasum or thereafter.

CONSTITUTION: A feed additive containing a material effective for living bodies. The feed additive is obtained by adding (a) ≥20wt% calcium carbonate to (b) ≥10wt% at least one substance of a ≥14C straight chain or branched saturated or unsaturated monocarboxylic acid or a salt thereof or a wax having ≥40° C melting point, and granulating the resultant mixture. The above-mentioned material effective for the living bodies is a nutriment or a feed or drug containing the same, and preferably absorbed through the abomasum or thereafter effectively in the bodies of individual ruminants without consumption by microorganisms in the rumen. Examples of the material include amino acids, proteins, vitamins, veterinary drugs, hormones, etc.

## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

This Page Blank (uspto)

## ® 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

# ⑩公開特許公報(A)

昭60 - 168351

@Int\_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

**匈公開** 昭和60年(1985)8月31日

1/175 A 23 K 1/18

6754-2B 6754-2B

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

飼料添加組成物 69発明の名称

> 创特 阻 昭59-10328

図出 昭59(1984)1月25日

司 真 勿発 明 者 安 東

名古屋市南区流春町5番地

政三 の発 明 者 太 黑 田 逄 良 名古屋市緑区鳴海町三高根54番地

眀 者 田 79発

東海市名和町向廻間一丁目2番地 春日井市松新町3丁目3078番地の78

佳 資 者 辺 ⑫発 明 渡 三井東圧化学株式会社 願 人 包出

東京都千代田区霞が関3丁目2番5号

眀

1 発明の名称

飼料添加組成物

#### 2. 特許請求の範囲

少なくとも、1種の生体にとって有効な物質を 含有する飼料添加組成物において炭酸カルシウム を20重量%以上含有し、かつ炭素数14以上の直 鎖状又は分枝状の飽和又は不飽和モノカルポン酸 又はその塩、又は融点 4 0℃以上の動物性油脂、又 は融点40℃以上の植物性油脂、又は融点40℃以 上のロウから選ばれる少なくとも1種の物質を10 重量多以上含有し造粒した事を特徴とする飼料器 加組成物。

#### 3.発明の詳細な説明

本発明は、飼料添加組成物に関する。更に群し くは、生体にとって有効な物質を保護する事によ り、反すう動物の第1胃を通過させ、第4胃以降 で溶出させる特徴を有した飼料添加組成物に関す るものである。

反すう動物は第1胃(ルーメン)に種々の微生 物を共生させ、彼らの働きを借りる事によって本 来高等動物は利用できないセルロースなどの成分 も消化し、利用している。第1胃の存在と機能は 反すう動物にとって値めて大きな意味を持つもの である。しかしながら、近年反すり動物の生理学 的、栄養学的研究を通じ、反すう動物の生産性を 制約する要因の1つとしての第1胃の存在が指摘 されている。すなわち第1周では分解されてほし くない生体にとって有効な物質を第1胃を通過さ せ、第4胃以降で分解、吸収させる事により生体 にとって有効な物質をより効率的に利用しようと いう研究が盛んになっている。またより効率的な 経営を目差す畜産業界からも第1胃を通過させる 技術の開発が望まれており、いくつかの方法が提 出されているが、いずれも、その効果が充分であ るとは言えない。例えば、またドイツ特許第2212568 号には、生物学上有効な物質を、炭素原子14~22 個を有する脂肪族モノカルポン酸又はリシノール 酸又はかかる酸混合物からたるか又はかかる酸又

はかかる酸混合物の塩からなる被膜で被った粒子 形のものを示している。.

また特公昭 5 6 - 1 0 5 7 号には、生物学的に活性な物質を、炭素数が少なくとも 1 4 である飽和の直鎖もしくは分枝状の植換もしくは未置換の脂肪族モノカルポン酸もしくはその塩と炭素数が少なくとも 1 4 である不飽和の直鎖もしくは分枝状の置換もしくはその塩を成れているものな示している。

また特開昭 5 6 - 1 5 4 9 5 6 号には、生物学上有効な物質に、炭素原子 1 4~2 2 個を有する脂肪族モノカルボン酸又は前記酸の数額の混合物の塩を含有する被膜を備えている粒子の形のものを示している。さらに特開昭 5 8 - 1 7 5 4 4 9 には、生物学的活性物質を、炭素原子 1 4~2 2 個を有する直鎖又は分枝状の飽和又は不飽和のモノカルボン酸、硬化した植物性脂肪及び硬化した動物性脂肪の中から週ばれる 1 種又は 2 種以上の物質とキトサン

- 3 -

ばれる少なくとも 1 種の物質(以下、この物質を保護物質 「と略す)の少くとも 1 0 重量 %の他に、 炭酸カルンウムを少くとも 2 0 重量 % 含有 し、し かも造粒した飼料添加組成物が上記のような欠点 のない、優れた性能を有する事を見出し本発明を 完成させるに至った。

以下、本発明を更に詳細に説明する。

本発明の飼料添加物が対象とする動物は反すう動物であり、その代表的な例は、 肉用牛、 乳用牛、 子牛、羊、山羊等である。

 とを含有する保護物質の被膜で包囲したものを示 している。

しかしながらドイツ特許第2212568号、特公昭56-1057号においては、被膜物質の崩壊が小腸以降で行なわれる事を期待しているため、消化吸収に使用される時間には制約があり、消化吸収が充分に行なわれない欠点を有している。また特開昭56-154956号、特開昭58-175449号においては、上記の欠点を克服すべく、第4門内で崩壊し、生体にとって有効な物質を溶出しめる被膜物質を使用しているが、被膜物質の第4門内での崩壊作用が充分ではなく、その効果は安定しているとは言えない。即ち未だ満足する飼料添加物がないのか実情である。

本発明者等は以上の様な情勢下穏々検討した結果、意外にも、炭素数14以上の直鎖状又は分枝状の飽和又は不飽和モノカルポン酸又はその塩、又は融点40℃以上の動物性油脂、又は融点40℃以上のセッから退

- 4 -

しては例えばN-アシルアミノ微例えばN-ステ アロイルメチオニン又は N - オレオイルメチオニ ン、N-ヒドロキシメチルメチオニンのカルシウ ム塩、リジン塩酸塩、メチオニンヒドロキシアナ ログ、グルタミン酸ナトリウム、蛋白質で、羽毛 粉末、魚粉、カゼイン、トウモロコンを白質又は パレイショ~白質にも適用できる。更にヒタミン としては、ピタミンAi、ピタミンAパルミチン酸 塩、ビタミンA酢酸塩、βーカロチン、ビタミン Da、ビタミン Da、ビタミン E、メナジオン重亜硫 酸ナトリウム、ビタミンB群(チアミン、塩酸チ アミン、リポフラピン、ニコチン酸、ニコチン酸 アミド、パントテン酸 カルシウム、パントテン酸 コリン、塩酸ビリドキシン、塩化コリン、シアノ ヨパラミン、ピオチン、糞酸、パラアミノ安息香 **設)、酵素類としては、プロテアーゼ剤、アミラ** ーゼ剤、混合酵素剤、リパーゼ剤、炭水化物とし ては、デンプン、プドウ糖、ショ糖、動物薬とし ては、テトラサイクリン系、アミノ配館体系、マ クロライド果、ポリペプタイド系、ポリサッカラ

イド系、ポリエーテル系等の抗生物質、ネグフォン等の駆虫剤、ピペラジン塩等の虫下し、ホルモンとしては、エストロジエン、スチルペストロール、ヘキセストロール等の発情ホルモン、チロブロテイン、ゴイトロジエン等の甲状腺ホルモンが挙げられる。

通常これらは 1 種で用いられるが、 2 種以上の 混合物も使用可能である。

- 7 -

#### 実施例 1 ~ 4 比較例 1, 2

要1に示す組成の物質をリボンミキサーによりあらかじめ均一混合した後、ペレタイザーを用い、直径2mm、長さ5mmのペレットを製造した。得られたペレット状飼料添加組成物を用い、人工第1胃液、人工第4胃液としては、0.1 Mリンはナトリウム緩衝、人工第4胃液としては、0.1 Mリンは大工第4胃液を100ml入れた三角フラスコに大工第4胃液を100ml入れた三角フラスコに大工第4胃液を100ml入れた三角フラスコに大工第4胃液を100ml入れた三角フラスコに大工第4胃液を100ml 人工第4胃液では3時間振とう後、それぞれ溶出したの近とう時間振とう時間に大工第1胃液では10時間、人工第1胃液では10時間、人工第1胃液では10時間、人工第1胃液では3時間とした。

各実施例及び各比較例の配合割合及び溶出テスト結果を第1表に示す。

#### 実施例 5

DL-メチオニン 25 重量%、ステアリン酸 25 重量%、炭酸カルシウム 50 重量%を用いて、実 で溶出しにくくなる事等の問題があり充分な効果が待られない。

本発明の飼料添加組成物を製造する方法としては、転動造粒法、押し出し造粒法、打袋成形等の圧縮造粒法、溶融造粒法、噴霧造粒法、流動造粒法、破砕造粒法、挽拌造粒法等の造粒技術を用いてペレット状、粒子状、錠剤状に成形する方法があげられる。また場合に応じて粘結剤等を添加してもよい。

本発明の飼料添加組成物は、通常飼料に直接添加して用いるが、例えば配合飼料の製造時にあらかじめ添加温合しておく事も可能である。

以上の様に本発明の飼料添加物は、反すう動物の第1胃を通過し、第4胃以降で溶出する優れた性質を有し、しかも含有される炭酸カルシウムはそれ自身カルシウム源として有効であるので、産業上極めて有用である。

以下、実施例を挙げて本祭明を更に詳細に説明する。

なお例中の部は重量部であり%は重量%である。

-8-

施例 1 ~ 4 と同様 K ペレットを製造し、溶出テストを行った。溶出したメチオニン量は、人工第 1 胃液下で 1 7 %、人工第 4 胃液下で 8 4 % であった。

#### 实施例6,7

実施例1~5と同様にして、ニコチン酸アミドを含有するペレットを製造した。溶出したニコチン酸アミドはN含量をキエルダール法で測定した。 配合割合及び結果を第2表に示す。

第 1 表

突施例 (比較例)		57		合	溶出したメテ	(B) - (A)	
		DLーノチオニン (知)	5.4 ℃硬化抽 (56)	決酸カルシウム (5)	人工第1胃核下 (%) (A)	人工第4 胃液下 (6) (B)	(6) (6)
夹施例	1	2 5	2 5	5 0	1 5	8 5	7 0
	2	2 5	3 5	4 0	1 2	8 3	7 1
	3	3 0	1 5	\$ 5	2 1	8 7	6 6
	4	3 0	5 0	2 0	1 2	7 0	5 8
比較例	1	2 5	7 0	. 5	8	1 8	5
	2	2 5	6 5	1 0	1 0	1 8	8

(注1 ) 全Dレーメチォニンに対する潜出したDLーメテオニンの量をあで示す。

- 11 -

第 2 表

<u> </u>		Æ		<b>⊕</b>	着出したニコテン酸アミド(注2)		
		ニロチン酸アミド (妈)	5.4℃硬化油 (%)	炭液 カルンウム (5)	人工第1胃液下 (奶) (A)	人工第 4 胃液下 (56) (B)	(B) — (A) ( <del>9</del> )
*	6	2 5	2 5	5 0	1 8	8 9	7 1
类例	7	3 0	3 5	3 5	1 7	6 5	6.8

(性2) 全ニコテン酸アミドに対する溶出したニコテン酸アミドの量を多で示す。

特許出顧人 三井東圧化学株式会社

#### 手 続 補 正

昭和60年3月20日

特許庁長官 忠 賀 学 殿

1. 事件の表示

昭和59年特許顧第10328号

2. 発明の名称

飼料添加組成物

5. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

住 所 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号

名 称(512)三井東圧化学株式会社

代表者 笠 間 祐一郎 電話 593-7416

4. 補正の対象

明細書の発明の詳細な説明の欄

5. 補正の内容

明細書の第11頁の記載を別紙の通りに補正する。

₫	施例	配		合	溶出したメチオニン (注1)		
	比较例)	DL-メチオニン (名)	54℃硬化油 (%)	炭酸カルシウム (50)	人工第1胃液下 (%) (A)	人工第4 胃液下 (%) (B)	(B) — (A) (%)
	1	2 5	2 5	5 0	1 5	8 5	7 0
実	2	2 5	3 5	4 0	1 2	8 3	7 1
施	3	<b>5</b> 0	1 5	5 5	2 1	8 7	66
例	4	3 0	5 0	2 0	1 2	7 0	5 8
— 比	1	2 5	70	5	8	1 3	5
較	2	2 5	. 6 5	1 0	1 0	1 8	8
例	3	6 1	9	3 0	8 1	93	1 2

(注1) 全DL-メチオニンに対する溶出したDL-メチオニンの量を多で示す。

This Page Blank (uspto)